

EN FRANCE, LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS, C'EST...

12^e
cancer féminin

12^e
cause de mortalité par
cancer chez la femme

3 129 | nouveaux cas de
cancer du col de
l'utérus / an

200 000 | tests de dépistage
anormaux / an

1 100 | décès / an


32 000 | lésions
précancéreuses / an

@CRCDC-CVL - Janvier 2024

Les cancers du col de l'utérus sont provoqués par des virus de la famille des Papillomavirus humains (HPV). Ces virus se transmettent lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Le préservatif ne permet pas de s'en protéger complètement. Dans 9 cas sur 10, le corps élimine de lui-même ces virus.

Lorsqu'une infection par les HPV persiste (dans 10% des cas), elle peut entraîner des lésions sur le col de l'utérus qui peuvent, au bout de plusieurs années, évoluer vers un cancer.

90%




**DES CANCERS DU COL DE L'UTÉRUS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS GRÂCE
AU DÉPISTAGE**

Vous êtes une femme de 25 à 65 ans ? Faites-vous dépister. Le test permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison.

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS, LES RECOMMANDATIONS FRANÇAISES :

entre **25 et 29 ans**

2 tests de dépistage à
1 an d'intervalle puis 3 ans après
si les résultats sont normaux



entre **30 et 65 ans**

1 test de dépistage tous les 5 ans,
3 ans après le dernier
test normal

Le professionnel de santé (médecin généraliste, gynécologue, sage-femme, laboratoire) prélève des cellules au niveau du col de l'utérus. Le prélèvement (communément appelé frottis) est ensuite analysé par le laboratoire.

Pour en savoir plus →



LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)

Chaque année en France, 6 400 nouveaux cas de cancers sont causés par les papillomavirus humains (ou HPV) : 100 % des cancers du col de l'utérus sont dus aux infections liées aux HPV et plus de 25 % des cancers provoqués par les HPV touchent les hommes. 80 % des femmes et des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie.

Aujourd'hui, la vaccination contre les HPV prévient jusqu'à 90 % des infections HPV à l'origine de cancers. Elle est recommandée pour les filles et les garçons entre 11 ans et 14 ans. Elle peut également être proposée en rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans.

Parlez-en avec votre médecin, sage-femme ou pharmacien.

Pour en savoir plus →

